

ATAK Prášek na mravence AMP 2 MG

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Účel použití a forma přípravku: Mikrogranule na likvidaci mravenců posypem, postřikem nebo pokropením (biocidní insekticid - sk. 18). ATAK Prášek na mravence AMP 2 MG je prostředek ve formě mikrogranulí k okamžité likvidaci mravenců s dlouhodobým působením. Prostředek je bez zápachu a nabízí velkou flexibilitu použití, jelikož ho lze aplikovat 3 různými způsoby: posypem, postřikem nebo pokropením. Díky obsahu acetamipridu má ničivý účinek na všechny druhy mravenců a poskytuje dlouhodobou ochranu. Pro amatérské i profesionální použití.

Návod na použití a dávkování

Produkt aplikujte v místech, jimiž mravenci procházejí nebo kde se zdržují, podél stěn v prasklinách a škvírách, u vstupů do hnízda.

Posyp: Rozprašte jemnou vrstvu přípravku v množství 20 g/m². V případě potřeby opakujte každé 2-3 týdny. Ošetřená místa chraňte před úklidem. Ošetřené povrchy nečistěte, aby zůstala zachována účinnost insekticidu.

Postřik: Smíchejte přípravek s vodou v rozprašovači v poměru 100 g/ 1 litr. Jeden litr aplikační kapaliny stačí na postřikání 5 m².

Pokropení: Tato aplikace je určena pouze pro venkovní prostředí. Smíchejte přípravek s vodou v konvi v poměru 20 g/1 litr. Jeden litr aplikační kapaliny stačí na pokropení 1 m².

Časové období potřebné pro biocidní účinek: Při laboratorních testech stačilo pouhých 10 minut po aplikaci ke zlikvidování 100 % mravenců. Doba působení účinku min. 90 dnů po aplikaci.

Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repetent pro zvířata.

Pokyny pro první pomoc

Při nadýchání: Vyjděte na čerstvý vzduch. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

Po styku s kůží: Omýt vodou a mýdlem. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

Při zasažení očí: Vyplachovat široce otevřené oči pod tekoucí vlažnou vodou několik minut.

Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

Při požití: Vyhledejte lékaře a ukažte tuto etiketu přípravku. Konzultujte situaci s toxikologickým střediskem.

Poznámky pro lékaře: Symptomatická léčba

LÉKAŘSKÁ POMOC:

V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko:

Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: **+420224919293** nebo **+420224915402**

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku.

Obsahuje / účinná látka: acetamiprid 2 g/kg
Dále obsahuje hořké činidlo (denatonium benzoate)

P věty

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal podle předpisů.

Upozornění:

Uchovávejte pouze v původním obalu. Nepoužitý produkt odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu. Nevylévat do kanalizace a vodních toků. Zákaz opětovného použití obalu.

Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu.

Skladování: Skladovat při teplotě 5 až 35 °C.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh: MZDR 21641/2012/SOZ

Balení: 100 g, 300 g

Výrobce: Kwizda-France S.A.S, 30, Avenue de l'Amiral Lemonnier, F-78160 Marly-le-Roi, Francie,

Tel : +33 (0)1 39 16 09 69

Distributor pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, tel.: +420 553 626 660, www.agrobio.cz