

Přípravek obsahuje hořké ochucovadlo, které snižuje riziko konzumace dětmi a domácími zvířaty

PT14 Rodenticidní přípravek ve formě měkké nástrahy pro použití širokou veřejností k hubení potkana obecného a myši domácí v budovách a jejich bezprostřední blízkosti

VAROVÁNÍ

Může způsobit poškození orgánů (krve) při prodloužené nebo opakované expozici

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obal/obsah předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Návod k použití: Široká veřejnost by před použitím přípravku měla zvážit, zda by pro dosažení požadovaného regulačního účinku nebylo dostatečné použití mechanických pastí nebo jiných nechemických metod. V nezbytném případě by přípravek měl být aplikován v deratizačních staničkách přiměřeně odolných proti násilnému otevření, pokud možno upevněných k zemi či jiným konstrukcím. Deratizační staničky by měly být označeny výstražnými informacemi „ Nepřemísťujte a neotvírejte“, „ Obsahuje přípravek na hubení hlodavců PROTECT FRESH BAIT s účinnou látkou bromadiolon“, „ V případě nehody volejte Toxikologické informační středisko, tel. č. 224 919 293 a 224 915 402“, „ Nebezpečný pro volně žijící zvířata“.

Umístěte staničky mimo dosah dětí, ptáků, domácích a hospodářských zvířat a jiných necílových organismů, v bezprostřední blízkosti očekávaného výskytu hlodavců. Odstraňte potraviny, které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné (mimo to zasaženou oblast nečistěte, neboť to populaci hlodavců ruší a ztěžuje příjem nástrahy). Neumísťujte nástrahu v blízkosti potravin, nápojů, krmiv a ani nástrojů a povrchů, které s nimi přicházejí do kontaktu. Neumísťujte nástrahu v blízkosti drenážních systémů, kde mohou přijít do styku s vodou. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití přípravku si umyjte ruce a přímo zasaženou pokožku. Na konci deratizace odstraňte zbývající nástrahu nebo deratizační staničky.

Opatření ke zmírnění rizika: Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření. Nepoužívejte přípravek jako stálou nástrahu za účelem prevence zamoření nebo sledování aktivity hlodavců. Postupujte podle metodických pokynů pro provádění ochranné deratizace vydaných podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/200Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud během 35 dnů od zahájení deratizace nedojde k účinnému potlačení hlodavců, vyžádejte si radu dodavatele nebo se obraťte na deratizační službu. V průběhu deratizace vyhledávejte a odstraňujte uhynulé hlodavce a to nejméně se stejnou frekvencí, s jakou kontrolujete deratizační staničky. Uhynulé hlodavce likvidujte v souladu s místními požadavky. Doporučuje se používat rukavice.

Dávkování: myš domácí - 40 g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů. **Potkan obecný** - 100g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li potřeba více deratizačních staniček musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů při vysoké míře zamoření a 10 metrů při nízké. Při aplikaci kolem budov chraňte staničku před povětrnostními podmínkami. Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejdříve za 2-3 dny v případě myši a 5 až 7 dnů (potkan) od zahájení deratizace. Následně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou staničky neporušené a za účelem

odstranění těl uhynulých hlodavců (mj. pro snížení rizika sekundárních otrav). V případě potřeby doplňte nástrahu.

Informace o účincích přípravku a pokyny pro první pomoc: Tento přípravek obsahuje antikoagulační látku. Při požití se mohou objevit příznaky, a to i se zpožděním, mezi něž může patřit krvácení z nosu a z dásní. V závažných případech se mohou vyskytnout i krevní výrony a ve stolici a moči se může objevit krev. **Antidotum: vitamín K1 podávaný pouze zdravotnickými/veterinárními pracovníky.** V případě **potřísnění pokožky** omyjte pokožku vodou a následně vodou a mýdlem. **Zasažené oči** vypláchněte roztokem na vyplachování očí nebo vodou a udržte víčka otevřená po dobu minimálně 10 minut. Při **orální expozici** vypláchněte ústa pečlivě vodou. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Nevyvolávejte zvracení. V případě polknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři ukažte obal přípravku. Při požití domácím zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře.

Skladování: skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte v uzavřeném obalu a chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte mimo dosah dětí, ptáků a domácích zvířat a hospodářských zvířat.

Držitel povolení: Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd., Szállás u. 6., H-1107 Budapest, Maďarsko, tel. (36–1) 43–20-400

Dodavatel: PROST a.s., Třebíčská 979, Náměšť nad Oslavou, CZ tel.: +420 568 620 158

Číslo povolení: CZ – 0021858-0000

UFI: MP6E-7SXE-A21D-GPUD

Účinná látka: Bromadiolon 27 mg/kg

Datum použitelnosti / číslo šarže :

Čárový kód 859 401 580 218 3